

ADHD BIJ VROUWEN

Eerste deel van de studie rond ADHD-medicatiegebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding

De druk die ADHD-patiënten ervaren wordt alleen maar versterkt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Mogen zij eigenlijk ADHD-medicatie nemen?

DAT WILLEN WIJ ONDERZOEKEN!

WIE ZOEKEN WE?

Vrouwen die vlot borstvoeding geven, waarvan:

①

geen ADHD
geen ADHD-medicatie
(controlegroep)



20



50

②

ADHD
ADHD-medicatie
(ADHD-groep)

WAT ONDERZOEKEN WE?

①

Wij gaan een methode ontwikkelen om de concentraties aan ADHD-medicatie in plasma, moedermelk en speeksel te kunnen bepalen.

Zo kunnen we nagaan hoeveel bij uw kindje terecht komt.

②

We gaan deze methode in deze eerste studie toepassen op vrouwen die ADHD-medicatie nemen.

Zo hebben we een idee hoe de concentraties variëren in plasma, speeksel en moedermelk.

WAT VERWACHTEN WE VAN U?

①

- Vragenlijsten invullen, bloed-, moedermelk- en speekselstalen.
- Eénmalige aanwezigheid op VUB site in Jette (Max. 1 uur)

②

- Vragenlijsten invullen, bloed-, moedermelk- en speekselstalen.
- Kolven voor 24 uur, waarvan 8 uur aanwezig op VUB site in Jette en verder thuis.
- **Je krijgt een bon van €40 en een gratis consultatie met een lactatiekundige!**



INTERESSE?

✉ Lena.De.Hondt@vub.be

☎ +32 2 477 42 89

